

# Cicutaire de Victorin

*Cicuta maculata* var. *victorinii*

Espèce désignée menacée au Québec  
Endémique à l'estuaire du Saint-Laurent

## Identification

(automne)

Herbacée des milieux humides, vivace et glabre.



Tige dressée souvent rayée de pourpre.



Court rhizome surmontant un faisceau de 5 à 6 tubercules oblongs.



Feuilles alternes, de 10 à 80 cm de long et de 4 à 8 cm de large, divisées en 3 segments composés de folioles linéaires-lancéolées finement dentées.



Inflorescence formée d'ombelles à petites fleurs blanches pédicellées 1, pédicelles inégaux.

Floraison de juin à septembre.



Akène double, beige, brun ou pourpre 2, de 3,5 à 4 mm de long. Ornés à maturité de côtes latérales proéminentes et de côtes dorsales foncées, peu ou pas développées.



Lorsque coupés, la tige et les tubercules exsudent un liquide huileux jaunâtre à odeur de panais.



Toutes les parties de la plante sont toxiques.




© MDDP, Francis Bourdreau



1

© MDDP, Francis Bourdreau



2

© MDDP, Francis Bourdreau

Ressemble à  
*Cicuta maculata* var. *maculata*.

# Habitat

Domaine bioclimatique de l'érablière à tilleul.

Marais intertidaux, le plus souvent dans les herbaçaias hautes et denses à spartine pectinée de l'étage supérieur et, parfois, dans les herbaçaias ouvertes et basses à scirpe piquant de l'étage moyen balayé par les marées.



## Enjeux de conservation

Espèce désignée menacée (Québec, 2001) et préoccupante (COSEPAQ, 1987), la cicutaire de Victorin s'est raréfiée à la suite de l'agrandissement des zones de villégiature, de la construction de nouvelles infrastructures routières et portuaires, de la circulation de véhicules tout-terrain et de la tonte de l'hydrolittoral.

Au Québec, il existe 45 occurrences, dont 3 datent de plus de 25 ans. Sur les 35 occurrences vérifiées récemment, seules 17 sont d'excellente ou de bonne qualité.

En cas d'observation, svp, compléter le formulaire d'occurrence du CDPNQ | [www.cdpnq.gouv.qc.ca](http://www.cdpnq.gouv.qc.ca)